

SPECIE:	<i>Lasius niger</i>
NOME VOLGARE:	Formica nera

DIMENSIONI

Adulto: operaia 3 - 5 mm;
regina 6,2-9,5mm



DIFFUSIONE

Diffusa in tutta Europa e in India.

HABITAT

Orti, giardini, campi, incolti, abitazioni, industrie alimentari, ecc..

Larva: nel nido sotterraneo accudita dalle operaie

Adulto: può diffondersi in abitazioni, magazzini, dispense, ecc. alla ricerca di cibo, spesso allontanandosi anche molto dal nido

ABITUDINI ALIMENTARI

Larva: viene nutrita con sostanze varie, per lo più zuccherine, dalle operaie

Adulto: si nutre di altri insetti morti e di sostanze zuccherine, come nettare, melata, zucchero e sciroppi

CICLO BIOLOGICO

Uovo > larva > pupa > adulto

Durata del ciclo: variabile in rapporto al clima e alla temperatura

N°uova/femmina: variabile secondo il cibo assunto dalla regina

Svernamento: come intera colonia entro i nidi

DANNI

Diretti alle sostanze attaccate; non è nota la possibilità di trasmettere germi patogeni. L'insetto, data la sua facoltà di allevare afidi per nutrirsi delle loro secrezioni zuccherine, può risultare dannoso anche al verde urbano.